



REPORTE ESTADISTICO CIAAT TOXIMED

ARGENTINA.

Cortese, S. Di Nardo, V. Garcia Puglisi, S. Seybol, S. Torrico Adriazola, A.

Nº: XX

Objetivo: comunicar el perfil de atención y la estadística de la asistencia toxicológica en internación y consultorio de un CIAAT privado. Teniendo como característica propia la asistencia presencial de los pacientes.

Material y Métodos se consideró el periodo 01 Enero a 31 Diciembre 2021. Se revisaron los registros del CIAAT.

Se atendieron un total de 2625 consultas, 1361 consultas de internados, 1264 de consultorio externo(CE).

La edad media en internación fue de 31.2 años con una distribución de menores de 6 años el 14%, entre 6 y 12 años 6.8%, entre 13 y 19 años 13.4% y mayor de 20 años 65.8%. La edad media en CE fue de 43.2 años.

El perfil de intoxicaciones en internación fue por sustancias no farmacológicas 252 consultas, que incluyen cáusticos, picaduras/mordeduras, gases, hidrocarburos, alcoholes tóxicos, metales, plantas, raticidas, insecticidas, productos de limpieza y cosméticos. De los 141 consultas de intoxicados por gases, el 74% fue por Monóxido de Carbono puro. Por sustancias farmacológicas 1063, psicofármacos, sustancias de abuso, y medicamentos. De estos últimos destacamos el aumento en las consultas por paracetamol en el año 2012 fue de 63 consultas(21 pacientes) y 2021 156 consultas (56 pacientes), hubo también un aumento en las consultas por Ibuprofeno. Los psicofármacos hubo 336 consultas, la distribución fue 105 consultas por combinación de los fármacos y 231 con ingesta de un solo tipo. Hubo un 58.9%de intoxicación con benzodiazepinas, un 25.2% con antipsicóticos, seguido en frecuencia con anticonvulsivantes (carbamacepina, lamotrigina, ácido valproico) 52 consultas, inhibidores de la recaptación de serotonina 55 consultas e intoxicación con Litio 27 consultas. Respecto a las sustancias de abuso hubo 408 consultas, alcohol 204, Cocaína 120, NDPD (LSD sintético, MDMA, Metanfetamina, Ketamina) 42 consultas y opioides 37.

De las 1264 consultas en consultorio 1091 fueron por sustancias de abuso, 98% cesación tabaquica y alcoholismo. De las 173 consultas por sustancias no farmacológicas el 47.4% fue control de intoxicación con Monóxido.

La presencia del médico toxicólogo permite la valoración exhaustiva de los signos arribando a diagnósticos adecuados, instituyendo los tratamientos necesarios y evitando el subdiagnostico de intoxicaciones poco frecuentes y además nos permite el seguimiento posterior a la internación aguda.

Conclusion necesidad de campañas de prevención en consumo problemático de sustancias, dado el aumento en relación a años previos(260 a 408 año 2012- 2022) que se evidencia en otros CIAATs y también la necesidad de reglamentar la venta de acetaminofeno e ibuprofeno para prevenir intoxicaciones o mal uso.