



REPORTE DE CASOS TRASTORNO CONSUMO OPIOIDES.

Cortese, S. Risso, M. Grau, G. Gómez, M.
Unidad de Toxicología Clínica y CPS, Hospital Fernández

Nº: **TCLIN**
34


Introducción: Los medicamentos opioides son un grupo amplio de medicamentos analgésicos utilizados para el alivio del dolor, en condiciones como politraumatismos, posquirúrgico y oncológicos. El Reporte Mundial de Drogas 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, estima que aproximadamente 53 millones de personas consumieron opioides sin prescripción en 2017, de las cuales la mitad corresponde a sustancias como la morfina o heroína, señalando un aumento significativo frente al año anterior. En la década del 90 fueron los orígenes de la crisis de opioides que vive actualmente Estados Unidos.

Entre el 8 y el 12% de las personas que usan algún opioide para el dolor crónico desarrollan un TCO



80% de las personas que consumen heroína abusaron antes de los opioides recetados.

**ANALGESICOS OPIOIDES
SIN PRESCRIPCION MEDICA**
**PREVALENCIA
DE VIDA 6.1%**



cajas de
30 comprimidos

Objetivos:

- Comunicar el reporte de seguimiento de los dos últimos años de los pacientes con Trastornos por Consumo de Opioides (TCO), atendidos en la División Toxicología del Hospital Fernández.
- Evaluar la adherencia al tratamiento, vía de uso más frecuente y tipo de opioide utilizado.

Material y Métodos


- Estudio retrospectivo se revisaron las historias clínicas de junio 2019 a junio 2022 de pacientes con TCO dominante.
- Se seleccionaron 99 pacientes.

EDAD MEDIA 40.8 AÑOS
CONSUMO OTRAS SUSTANCIAS
PERSONAL DE SALUD 1 DE 12 USUARIOS
NO PERSONAL DE SALUD 51 DE 87 USUARIOS
GENERO
TRATAMIENTOS INDICADOS
TRO 22 PACIENTES
NALTREXONA 4 PACIENTES
REDUCCIÓN DE OPIOIDE DE CONSUMO 75


Distribución por Pertenencia de los Usuarios al Personal de Salud n 99 usuarios




DISTRIBUCION POR VIA DE USO n 99




Relación entre Tiempo de Tratamiento y uso de TRO n 99



Distribución por Opioides No Personal de Salud n87



Distribución por vía de uso y tipo de usuario n 99



Conclusiones Las guías internacionales de tratamiento por TCO recomiendan el TRO como tratamiento de primera línea, La diferencia de las experiencias del hemisferio norte es el uso parenteral de opioides como más frecuente, en la región el uso oral lo supera. **Se deberán realizar estudios prospectivos para evaluar si la TRO también es la indicada.**